PROYECTO DE PROSPECTO

Industria Argentina

NENE DENT NF

TINTURA DE MANZANILLA *(Matricaria recutita L.)*
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO
POLIDOCANOL

Anestésico local y analgésico tópico

Gel
Venta libre

FÓRMULA

Cada 1 g contiene:

Tintura de manzanilla (*Matricaria recutita L.*)	150,00 mg
Lidocaína clorhidrato	3,40 mg
Polidocanol 600	3,20 mg
Propilenglicol	150,00 mg
Xilitol	90,00 mg
Edetato disódico	1,00 mg
Sorbitol 70%	100,00 mg
Carbopol (974 P)	12,00 mg
Polisorbato 20	6,00 mg
Sacarina sódica	2,00 mg
Mentol	0,60 mg
Hidróxido de sodio	4,40 mg
Agua purificada c.s.p	1 g

USO DEL ME¨DICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Se utiliza tradicionalmente como medicamento para aliviar por corto plazo las molestias de la primera dentición.
La tintura de manzanilla (*Matricaria recutita L.*)posee propiedades astringentes, antisépticas y cicatrizantes contribuyendo a reparar las encías lesionadas por el borde cortante del diente en erupción. Actúa asimismo como antiinflamatorio y descongestivo aliviando el dolor, la irritación y las molestias de la gingivitis que acompañan a la dentición.

La lidocaína es un anestésico que se adapta especialmente para su aplicación sobre las mucosas debido a su rápido comienzo de acción y a la duración de la misma, manteniendo una sostenida acción calmante del dolor al aplicar el preparado sobre la encía.
El polidocanol tiene una acción anestésica local y a la vez favorece la dispersión y difusión de los principios activos aplicados sobre las mucosas.

INDICACIONES

Tratamiento del dolor e inflamación de las encías (gingivitis) ocasionados por la dentición.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO

MODO DE EMPLEO

NENE DENT NF Gel es un preparado para uso local para ser empleado exclusivamente en la mucosa de las encías para eliminar las molestias de la dentición.

Ante las primeras molestias de dolor e inflamación por el comienzo de la dentición coloque una pequeña cantidad de gel ó 1 ó 2 gotas de la solución sobre la yema de su dedo o emplee un hisopo de algodón y aplique el preparado sobre la encía del niño en el sitio de la erupción dentaria, mediante un suave masaje.
El tratamiento puede continuarse hasta la erupción de todos los dientes de leche incluyendo la de los molares.

DOSIS

Aplicar NENE DENT NF Gel en la forma indicada 2-3 veces por día.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si los síntomas (mayor enrojecimiento o inflamación de las encías) empeoran, o aparecen molestias concomitantes, consulte a su médico.

Deberá administrarse con precaución en caso de antecedentes de reacciones alérgicas, alergia al polen, asma.

CONTRAINDICACIONES

Este medicamento no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad (alergia) a la lidocaína o a los anestésicos locales, manzanilla (*Matricaria recutita L.*), polidocanol y/o a cualquiera de los excipientes. Contraindicado en niños menores de 4 meses.

EFECTOS ADVERSOS

Se han descripto reacciones alérgicas por la administración tópica de lidocaína, polidocanol y manzanilla (*Matricaria recutita L.)*

INTERACCIONES

No se han descripto hasta el presente.

SOBREDOSIFICACIÓN

En la eventualidad de una sobredosificación o intoxicación accidental concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666/2247.
HOSPITAL ALEJANDRO POSADAS: (011) 4654-6648/ 4658-7777.

Optativamente con otros Centros de Intoxicaciones.

CODIGO ATC: N 01 BX

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO

PRESENTACIONES:

GEL: Pomos con 10 g.

CONSERVACIÓN
Conservar entre 0 y 25ºC, al abrigo de la luz.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº: 52.483

Director Técnico: Silvia G. Peretto - Farmacéutica

Fecha de la última revisión: 05-10-2005

Elaborado por:
Cnel. Mendez 440 - Wilde - Buenos Aires

Nycomed S.A.
Tronador 4890 - Buenos Aires

Bajo licencia de: DENTINOX Gesellschaft für Pharmazeutische Präparate - Berlín - Alemania

PROYECTO DE ROTULO

Industria Argentina Envase con 10 g

NENE DENT NF

TINTURA DE MANZANILLA *(Matricaria recutita L.)*
LIDOCAINA CLORHIDRATO
POLIDOCANOL

Anestésico local y analgésico tópico

Gel

Venta libre

FÓRMULA

Cada 1 g contiene:

Tintura de manzanilla (*Matricaria recutita L.*)	150,00 mg
Lidocaína clorhidrato	3,40 mg
Polidocanol 600	3,20 mg
Propilenglicol	150,00 mg
Xilitol	90,00 mg
Edetato disódico	1,00 mg
Sorbitol 70%	100,00 mg
Carbopol (974 P)	12,00 mg
Polisorbato 20	6,00 mg
Sacarina sódica	2,00 mg
Mentol	0,60 mg
Hidróxido de sodio	4,40 mg
Agua purificada c.s.p	1 g

POSOLOGIA:
Ver prospecto adjunto.

CONSERVACIÓN
Conservar entre 0 y 25ºC, al abrigo de la luz

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº: 52.483
Lote Nº:
Partida Nº:
Fecha de vencimiento:

Director Técnico: Silvia G. Peretto - Farmacéutica

Elaborado por:
Cnel. Mendez 440 - Wilde - Buenos Aires

Nycomed S.A.
Tronador 4890 Buenos Aires

Bajo licencia de: DENTINOX Gesellschaft für Pharmazeutische Präparate Berlín-Alemania